

ALERGIT[®] TABLETAS



COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene.

Loratadina 10 mg.

Excipientes C.S.P

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FARMACOCINÉTICA:

- La loratadina es activa por vía oral. Después de su administración, el comienzo de la acción antihistamínica tiene lugar hacia las 1-3 horas con un efecto máximo a los 1-12 horas y una duración del efecto que se extiende a más de 24 horas.

- La semivida de eliminación de la loratadina y de sus metabolitos es de 8.4 horas y 28 horas, respectivamente. La eliminación tiene lugar por vía renal y fecal.

- Los alimentos pueden aumentar la absorción de loratadina en un 40-50%.

MECANISMO DE ACCIÓN :

- Loratadina es un antihistamínico tricíclico con actividad selectiva sobre los receptores H1 periféricos.

- No ejerce una actividad significativa sobre los receptores H2. No inhibe la captación de norepinefrina y prácticamente no influye sobre la función cardiovascular o sobre la actividad intrínseca del marcapasos.

- Loratadina no presenta propiedades sedantes o anticolinérgicas clínicamente significativas en la mayoría de la población y cuando se utiliza a la dosis recomendada.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

- Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica estacional
- Urticaria idiopática crónica
- Alergias en general.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes con hipersensibilidad al fármaco o a alguno de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO:

La loratadina ha sido clasificada dentro de la categoría B de riesgo para el embarazo. Aunque los estudios en animales no han puesto de manifiesto efectos teratogénicos no existen estudios controlados en el ser humano y, por tanto se deberá evitar su uso durante el embarazo.

PRECAUCIONES DURANTE LA LACTANCIA:

La loratadina y sus metabolitos se excretan en la leche materna, por lo que se evitará su consumo durante la lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS:

La somnolencia y/o la sedación son los efectos secundarios más frecuentes de las antihistaminas H1.

Se ha observado somnolencia en el 8% de los pacientes tratados con loratadina frente al 6% en los tratados con placebo.

Aunque los efectos anticolinérgicos de la loratadina son mínimos, algunos pacientes

experimentan xerostomía (3%).

Las cefaleas son quizás el efecto secundario más frecuente observado con la loratadina con una incidencia del 12%. Sin embargo, menos del 1% de los pacientes se ve obligado a discontinuar el tratamiento debido a los efectos secundarios de la loratadina.

DOSIFICACIÓN:

- Adultos y niños mayores de 12 años: 1 tableta cada día.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

ADVERTENCIA:

Producto de uso delicado.

Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

PRESENTACIONES:

Caja x 40 tabletas recubiertas.

