

SINFEBRIL[®]



COMPOSICIÓN:

- Cada tableta recubierta contiene:
Ibuprofeno 600 mg.
Excipientes C.S.P.

- Cada (5mL) de suspensión contiene:
Ibuprofeno 100 mg.
Excipientes C.S.P.

- Cada (5mL) de Sinfebril Forte suspensión contiene:
Ibuprofeno 200 mg.
Excipientes C.S.P.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- Oral.

FARMACOLOGÍA:

El ibuprofeno se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, presentándose picos de concentraciones plasmáticas 1-2 horas después de la administración. Su vida media de eliminación es de unas 2 – 4 horas aproximadamente.

El ibuprofeno se une fuertemente a las proteínas plasmáticas y se metaboliza en el hígado, dando lugar a 2 metabolitos inactivos que, junto con el ibuprofeno, se excretan por vía renal bien como tales o como metabolitos conjugados. La excreción renal es rápida y completa.

Como todos los antiinflamatorios no esteroideos de la familia de los ácidos aril-propiónicos, el ibuprofeno inhibe la acción de las enzimas COX-1 y COX-2. Los efectos anti-inflamatorios del ibuprofeno son el resultado de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas subsiguiente a la inhibición de la ciclooxigenasa.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

- Cefalea.
- Fiebre de cualquier etiología (excepto dengue).
- Amigdalitis.
- Otitis.
- Mialgias.
- Artralgias.
- Esguinces.
- Artritis.
- Dolor Odontológico.
- Dolor Ginecológico.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a los Antiinflamatorios.
- Úlcera gástrica o duodenal.

EFFECTOS COLATERALES:

Alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal.

DOSIFICACIÓN:

Adultos:

Dolores intensos: 600 mg cada 8 horas

Dolores leves a moderados: 600 mg cada 12 horas

La dosis total diaria no debería exceder de 1.800 mg (4 tabletas de 600 mg al día).

Niños:

Dosis ponderal: 25kg/ 800mg (20mL) cada 8 horas.

Dosis de 25 a 40kg/ 1200mg(30mL) cada 8 horas

Dosis de 40kg/ 1.600 mg(40mL) cada 8 horas

No se aconseja utilizarlo en niños menores de 6 meses o que pesen menos de 25 kg.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

ADVERTENCIA:

Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

PRESENTACIONES:

-Caja por 20 tabletas recubiertas 600 mg.

-Caja por 2 tabletas recubiertas 600 mg (muestra médica).

-Suspensión 100 mg/5mL x 120 mL, sabor a frutas .

-Suspensión 100 mg/5mL x 45 mL, sabor a frutas (muestra médica).

-Suspensión forte 200 mg/5mL x 120 mL, sabor a chicle.

-Suspensión forte 200 mg/5mL x 45 mL, sabor a chicle. (muestra médica).



Biindustria[®]
"Protegemos su salud con calidad"