

# CHENAMOX<sup>®</sup>



CORPORACIÓN  
**FARMAYALA**  
*Su salud es nuestro COMPROMISO.*

## DAR CLIC EN LA PRESENTACIÓN

- CHENAMOX<sup>®</sup> 100 mg/mL GOTAS

# CHENAMOX® 100 mg/mL GOTAS

## COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de polvo para reconstituir contiene:

Amoxicilina Trihidrato polvo 17.894 g.

Equivalente a 100 mg. de Amoxicilina base

Excipientes: Azúcar blanca; Benzoato de sodio; Carboximetilcelulosa sódica; Sabor fresa polvo; Dióxido de silicio, Color rojo # 40.

**VÍA DE ADMINISTRACION:** Oral.

## QUÉ ES CHENAMOX 100 mg/mL Gotas Y PARA QUE SE UTILIZA

CHENAMOX 100 mg/mL Gotas se presenta en un frasco conteniendo polvo para reconstituir 30 mL de suspensión. Una vez preparada la suspensión, 1 mL de la misma contiene 100 mg de amoxicilina. Se acompaña cuentagotas calibrado para que cada gota represente 5 mg de Amoxicilina.

CHENAMOX (amoxicilina), es un antibiótico perteneciente al grupo de las penicilinas y es activo frente a la mayoría de las bacterias implicadas en las infecciones más habituales. CHENAMOX está indicado para el tratamiento de las infecciones producidas por bacterias en las siguientes localizaciones:

- Infecciones de tipo respiratorio, tales como, sinusitis, otitis, amigdalitis, bronquitis y neumonía
- Infecciones genito-urinarias e infecciones abdominales
- Infecciones de la piel y tejidos blandos, incluyendo infecciones de la herida quirúrgica
- Infecciones dentales
- Fiebre tifoidea y paratifoidea
- Infecciones del tracto biliar
- Enfermedad de Lyme o borreliosis, en el tratamiento de la infección precoz localizada (primer estadio o eritema migratorio localizado) y en la infección diseminada o segundo estadio
- Tratamiento de erradicación de *Helicobacter pylori* en asociación con un inhibidor de la bomba de protones y en su caso a otros antibióticos: úlcera péptica, linfoma gástrico de tejido linfoide asociado a mucosa, de bajo grado
- Profilaxis de la endocarditis

## ANTES DE TOMAR CHENAMOX 100 mg/mL Gotas

**No tome CHENAMOX 100 mg/mL Gotas:**

Si es alérgico a las penicilinas, a las cefalosporinas o a cualquier otro componente de la formulación.

**Tenga especial cuidado con CHENAMOX 100 mg/mL Gotas:**

Si después de tomar el medicamento se produjera alguna reacción alérgica. En este caso, suspenda el tratamiento y acuda a su médico lo antes posible.

Si padece usted mononucleosis infecciosa, consulte a su médico antes de tomar el medicamento. CHENAMOX se debe emplear con precaución en pacientes con problemas en el hígado o en el riñón.

Comunique a su médico que está tomando este medicamento ya que puede alterar los resultados de un análisis de sangre.

**Toma de CHENAMOX 100 mg/mL Gotas con los alimentos y bebidas:**

Es preferible tomar este medicamento con las comidas, sin embargo, también es activo si se toma sin alimentos.

## Embarazo y Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Su médico valorará la necesidad de emplear este medicamento.

## Información importante sobre algunos de los componentes de CHENAMOX 100 mg/mL Gotas:

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Por contener benzoato de sodio puede ser ligeramente irritante para la piel, ojos y membranas mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos.

## Toma o uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

Algunos medicamentos pueden reducir o aumentar el efecto de CHENAMOX si se toman conjuntamente.

Haga saber a su médico si está tomando alopurinol o probenecid.

## CÓMO TOMAR CHENAMOX 100 mg Gotas:

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento.

CHENAMOX 100 mg/mL Gotas, deberá administrarse por vía oral según las instrucciones recibidas de su médico.

CHENAMOX 100 mg/mL Gotas está especialmente indicado en niños menores de 6 meses. La dosis habitual es de 25-50 mg/kg/día administrados en tres tomas iguales. En recién nacidos (3-6 kg), 10, 20 gotas cada 8 horas y en niños de 4 meses a 1 año (6-10 kg): 20-35 gotas cada 8 horas.

Para el tratamiento de la enfermedad de Lyme: 25-50 mg/kg/día en eritema migratorio localizado y hasta 100 mg/kg/día en caso de manifestaciones generalizadas, durante un mínimo de 12 días. No suspenda el tratamiento, aún cuando se encuentre mejor, a menos que su médico se lo indique.

Si estima que la acción de CHENAMOX 100 mg/mL Gotas es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

No suspenda el tratamiento, aún cuando se encuentre mejor, a menos que su médico se lo indique.

## INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Invertir el frasco para desprender el polvo adherido al fondo. Agregar un poco de agua y agitar. Completar con agua hasta la línea marcada con la flecha. Agítese antes de usarlo. La suspensión tiene un agradable sabor a frutas. Puede administrarse mezclado con papillas, zumos, leche, etc. Una vez realizada la suspensión, mantiene su validez durante 14 días.

## SI UD. TOMA MÁS CHENAMOX 100 MG/ML GOTAS DEL QUE DEBIERA:

Es poco probable que se produzca sobredosis con este medicamento. Si por alguna circunstancia ha tomado más CHENAMOX 100 mg/mL Gotas de lo que debe, beba agua en gran cantidad y consulte inmediatamente a su médico.

## SI OLVIDÓ TOMAR CHENAMOX 100 MG/ML GOTAS:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente lo antes posible y continúe como hasta ese momento.

## POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, CHENAMOX 100 mg/mL Gotas puede tener efectos adversos. Los efectos adversos de este medicamento son normalmente leves y, por lo general, relacionados con el aparato digestivo (diarrea, náuseas, vómito). Si los síntomas continuaran o llegaran a ser más graves, o en caso de diarreas persistentes, consulte a su médico. Asimismo, se pueden producir reacciones que incluyan síntomas tales como: erupción cutánea con o sin picor. Ante la aparición de estos síntomas interrumpa el tratamiento y consulte a su médico inmediatamente.

Muy raramente se han producido casos de hepatitis e ictericia, ó alteraciones del sistema nervioso central como mareos o convulsiones. También muy raramente se ha asociado a este medicamento con reacciones adversas de mayor gravedad, tanto del aparato digestivo como hepáticas, renales o alérgicas.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura no mayor a 30 °C en lugar fresco y seco.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIONES:

Caja x 1 frasco x 19.8 g. de polvo para reconstituir 30 mL de suspensión + jeringa dosificadora + prospecto.

## VENTA BAJO RECETA MÉDICA

