

CLINDAMICHEM[®]



PRINCIPIO ACTIVO:

Cada cápsula contiene:

Clindamicina 300 mg

Excipientes C.S.P

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

FARMACOCINÉTICA:

- Después de su administración oral, se absorbe rápidamente el 90%. La velocidad de absorción es reducida por la presencia de alimento, pero no su extensión.
- En el adulto, las concentraciones séricas máximas alcanzan a los 45-60 minutos después de la administración. La clindamicina se une extensamente (92-94%) a las proteínas del plasma.
- Una vez absorbida, la clindamicina se distribuye ampliamente en órganos y tejidos, observándose las mayores concentraciones en los huesos, bilis y orina.
- La clindamicina atraviesa fácilmente la barrera placentaria y se excreta en la leche materna. La clindamicina se metaboliza formando 2 metabolitos activos (sulfóxido de clindamicina y N-desmetil-clindamicina) y varios metabolitos inactivos. Después de una dosis oral sólo el 10% del fármaco con actividad antibiótica es eliminado en el orina y el 3.6% en las heces. El resto es eliminado en forma de metabolitos inactivos.

MECANISMO DE ACCIÓN:

- La clindamicina se une a las subunidades 50S de los ribosomas bacterianos, inhibiendo la síntesis de proteínas.
- Dependiendo de su concentración en el lugar de su actuación y de la susceptibilidad del microorganismo, la clindamicina es bacteriostática o bactericida.
- La clindamicina es activa frente a una amplia variedad de gérmenes. Se admite que es activa frente a los siguientes microorganismos: *Actinomyces* sp.; *Babesia*

microti; *Bacteroides fragilis*; *Prevotella melaninogenica*; *Bacteroides* sp.; *Clostridium perfringens*; *Clostridium* sp.; *Clostridium tetani*; *Corynebacterium diphtheriae*; *Corynebacterium* sp.; *Cryptosporidium parvum*; *Eubacterium* sp.; *Fusobacterium* sp.; *Gardnerella vaginalis*; *Mobiluncus* sp.; *Mycoplasma* sp.; *Peptococcus* sp.; *Peptostreptococcus* sp.; *Plasmodium falciparum*; *Pneumocystis carinii* pneumonia (PCP); *Pneumocystis carinii*; *Porphyromonas* sp.; *Prevotella* sp.; *Propionibacterium* sp.; *Staphylococcus aureus* (MSSA); *Staphylococcus epidermidis*; *Streptococcus pneumoniae*; *Streptococcus pyogenes* (group A beta-hemolytic streptococci); *Streptococcus* sp.; *Toxoplasma gondii*; *Veillonella* sp.

- En particular, muchas cepas de estreptococos y estafilococos son extremadamente susceptibles a este antibiótico.

INDICACIONES:

- Tratamiento de Infecciones del tracto respiratorio inferior.
- Tratamiento de infecciones graves de la piel (úlceras diabéticas).
- Tratamiento de infecciones ginecológicas.
- Tratamiento de infecciones óseas o de las articulaciones (osteomielitis), septicemia y bacteriemia.
- Tratamiento de otras infecciones anaerobias producidas por gérmenes sensibles.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino (p.ej. colitis ulcerativa).
Pacientes con hipersensibilidad al principio activo o alguno de los componentes de la fórmula.

EFFECTOS ADVERSOS:

La administración oral de clindamicina puede producir náusea y vómitos y dolor abdominal. La

administración con los alimentos reduce las molestias gástricas.

Se han descrito trombocitopenia, neutropenia y eosinofilia durante los tratamientos con clindamicina.

EN EMBARAZO Y LACTANCIA:

La clindamicina se clasifica en la categoría B de riesgo en el embarazo. No está contraindicada en el embarazo, dado que no existe evidencia de malformaciones o alteraciones en el desarrollo del producto. Sin embargo, no se han realizado estudios bien controlados en mujeres embarazadas.

La clindamicina se excreta en leche materna en cantidades no significativas y no se han observado problemas en lactantes de madres que lo tomaban salvo gastroenterocolitis ocasional por alteración de la flora intestinal que cede a los pocos días de acabar el tratamiento.

DOSIFICACIÓN:

- Adultos: 300 mg cada 6, 8 o 12 horas dependiendo el proceso infeccioso.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

ADVERTENCIA:

Producto de uso delicado. Adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

PRESENTACIONES:

Caja x 24 cápsulas.

