

CLIN DUO[®]

(CLINDAMICINA + KETOCONAZOL)



ÓVULOS

COMPOSICIÓN:

Cada óvulo contiene:

Clindamicina..... 100 mg.

Ketoconazol..... 400 mg

Excipientes: Masa para óvulos (lactosa, Carbowax 1450, Carbowax 3350); Dióxido de silicio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vaginal.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:

Antibiótico y Antimicótico vaginal

INDICACIONES:

Indicado en el tratamiento de la vaginosis bacteriana causada por *Bacteroides* spp, *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp, *Mycoplasma hominis*, así como por otros gérmenes anaerobios. Por su acción antimicótica está indicado en el tratamiento de candidiasis vaginal y vaginitis mixta.

POSOLÓGIA:

La dosis usual es de 1 óvulo vía vaginal, una vez al día, de preferencia por la noche al acostarse, durante 6 días consecutivo.

CONTRAINDICACIONES:

Antecedentes de hipersensibilidad conocida a la clindamicina, lincomicina, ketoconazol, a cualquier antimicótico azólico y a los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS:

Uso durante el embarazo: Si bien los estudios realizados en animales no han demostrado efectos perjudiciales, se recomienda utilizar sólo después de evaluar el riesgo en función de la necesidad. No usar en el primer trimestre del embarazo. Uso durante la lactancia: Clindamicina no es excretada por la leche materna después de la administración vaginal, pero sí lo es luego de la administración oral o parenteral, por lo tanto se recomienda evaluar su utilización. Precauciones en el uso: Si bien en una formulación para uso local puede notar observación del antibiótico. Como todos los antibióticos, en personas susceptibles, y excepcionalmente en casos de su accionar sistémico puede ocasionar diarreas y en algunos casos colitis pseudomembranosa; si bien la cantidad de droga que se absorbe es mínima, en caso de aparecer esta sintomatología suspender el medicamento y diagnosticar convenientemente. Uso durante el embarazo: Si bien los estudios realizados en animales, no han demostrado efectos perjudiciales, se recomienda utilizar solo después de evaluar el riesgo en función de la necesidad. Uso durante la lactancia: Clindamicina no es excretada por la leche materna, después de la administración vaginal, pero sí lo es luego de la administración oral o parenteral, por lo tanto se recomienda evaluar su utilización.

Si bien en una formulación para uso local puede notar observación del antibiótico. Como todos los antibióticos, en personas susceptibles, y excepcionalmente en casos de su accionar sistémico puede ocasionar diarreas y en algunos casos colitis pseudomembranosa; si bien la cantidad de droga que se absorbe es mínima, en caso de aparecer esta sintomatología se debe suspender el medicamento y diagnosticar convenientemente.

EFFECTOS ADVERSOS:

En personas susceptibles puede ocasionar resequeadad de la mucosa vaginal, irritación vulvar y comezón. La administración de clindamicina por vía vaginal se ha relacionado con las siguientes manifestaciones clínicas, aunque no se ha comprobado completamente su responsabilidad.

Tracto genital: cervicitis/vaginitis sintomáticas, candidiasis, tricomoniasis vaginal e irritación vulvar. Con la administración de Ketoconazol por vía vaginal se han reportado pocos casos de irritación local, prurito y sensación de ardor, especialmente al comienzo del tratamiento. Por la mínima absorción de la clindamicina y el ketoconazol administrados por vía vaginal no se han observado reacciones adversas sistémicas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Se ha demostrado resistencia cruzada entre clindamicina y lincomicina. In vitro se determinó antagonismo entre clindamicina y eritromicina..

SOBREDOSIFICACIÓN:

No se ha informado respecto de la presencia de casos de sobredosis con este producto.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No utilice después de la fecha de caducidad. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Presentaciones Comerciales

Caja x 1 ristra x 5 óvulos vaginales + prospecto

Caja x 2 ristras x 5 óvulos vaginales c/u + prospecto

CAJA X 1 RISTRA X 7 ÓVULOS VAGINALES + PROSPECTO

Muestra Médica : Caja x 1 ristra x 2 óvulos vaginales + prospecto

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

ELABORADO POR:

INDEUREC S.A.

Km 2 1/2 de la Vía Durán - Boliche,

Durán, Ecuador.



Biindustria[®]
"Protegemos su salud con calidad"