

CLODOPAN GAS®



COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene:

Metoclopramida... 10 mg.

Simeticona... 200 mg.

Excipientes: Fosfato dibásico de calcio, Fosfato tricálcico, Croscarmelosa sódica, P.V.P. K-30, Estearato de magnesio, Dióxido de silicio, Opadry acryleze blanco, Alcohol etílico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiemético - Antinauseoso - Antiflatulento.

INDICACIONES:

La asociación Metoclopramida - Simeticona está indicada para el tratamiento de los trastornos digestivos funcionales que no se presentan como una evidencia de patología orgánica, tales como: dispepsia; gastritis; aerofagia; reflujo gástrico; meteorismo e hipermeteorismo; hipoquinesia gástrica; aero espasmo; pesadez estomacal; distensión post-prandial (digestión lenta); estado nauseoso; vómito; dolores cólicos y coadyuvante en el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Terapia de doble acción para enfrentar las afecciones digestivas de origen funcional. Simeticona: Rápida dispersión del gas atrapado en el tracto gastrointestinal, por ruptura de las burbujas de aire y mucus. Consecuentemente alivio del dolor que puede generar ansiedad adicional, hiperventilación y aerofagia. Metoclopramida: Rápida evacuación gástrica, aumento del tránsito en el intestino delgado sin alteración de la secreción gástrica.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a Metoclopramida, Simeticona o a cualquiera de los componentes. Hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal en los que la estimulación de la motilidad constituya un riesgo. Antecedentes de diskinesia tardía inducida por neurolepticos o Metoclopramida. Feocromocitoma confirmado o sospecha, debido al riesgo de episodios de hipertensión grave. Combinación con levodopa debido al antagonismo mutuo.

ADVERTENCIAS:

Pueden aparecer trastornos extrapiramidales especialmente en niños y adultos jóvenes y/o cuando se usan dosis elevadas (ver Efectos Colaterales). Estas reacciones adversas desaparecen completamente después de discontinuar el tratamiento. Puede ser necesario tratamiento sintomático (benzodiazepinas en niños y/o drogas anticolinérgicas anti parkinsonianas en adultos). La Metoclopramida no está recomendada en pacientes epilépticos pues las benzamidas pueden disminuir el umbral epiléptico. Se recomienda reducción de la dosis en pacientes con daño renal o hepático. Como con los neurolepticos, el síndrome neuroleptico maligno (SNM) caracterizado por hipertermia, trastornos extrapiramidales inestabilidad nerviosa autonómica y alza de CPK.

Por lo tanto, se debe tener precaución en si aparece fiebre, alguno de los síntomas del síndrome SNM y suspender la medicación si se sospecha un SNM. Se ha reportado metahemoglobinemia que podría estar relacionada a deficiencia en citocromo b5 reductasa. En estos casos, se debe discontinuar el medicamento de manera inmediata y permanente e instaurar medidas apropiadas.

EFFECTOS COLATERALES: DESÓRDENES DEL SISTEMA NERVIOSO Y PSIQUIÁTRICO:

Las siguientes reacciones, a veces asociadas, ocurren más frecuentemente cuando se usan dosis elevadas: Síntomas extrapiramidales: distonía aguda y diskinesia, síndrome parkinsoniano, acatisia, aún después de la administración de una dosis única de la droga, particularmente en niños y adultos jóvenes (ver Advertencias). Somnolencia, disminución del nivel de conciencia, confusión, alucinación. Pueden ocurrir otras reacciones: Diskinesia tardía, durante o luego del tratamiento prolongado, en especial en pacientes ancianos. Convulsiones, síndrome neuroleptico maligno, depresión. Gastrointestinal: Diarrea. Trastornos sanguíneos y del sistema linfático: Metahemoglobinemia que podría estar relacionada a deficiencia en citocromo b5 reductasa, particularmente en neonatos (ver Advertencias). Sulfameglobinemia, principalmente con la administración concomitante de dosis elevadas de drogas liberadoras de sulfuro. Trastornos endocrinos: Durante el tratamiento prolongado puede haber trastornos endocrinos en relación con galactorrea (amenorrea, galactorrea, ginecomastia).

Precauciones embarazo: El uso de Clodopan Gas durante el embarazo de ser necesario, puede ser considerado.

Lactancia: Metoclopramida es excretada a la leche materna por lo que reacciones adversas en el lactante no pueden ser excluidas. Se debe decidir si continuar la lactancia o suspender el tratamiento.

Efectos sobre la conducción de vehículos y realización de otras tareas peligrosas: Después de la administración de Metoclopramida puede haber somnolencia, potenciada por los depresores del SNC, alcohol; la habilidad para conducir u operar maquinarias puede estar deteriorada.

ALMACENAMIENTO:

Conservarse a temperatura no mayor a 30 °C en lugar fresco y seco.

Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

No utilice CLODOPAN GAS después de la fecha de caducidad. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Caja x 20 tabletas recubiertas

VENTA BAJO RECETA MÉDICA



Farmayala Medicines