

COENXIO[®]L 75 mg

TABLETAS RECUBIERTAS



CORPORACIÓN
FARMAYALA
Su salud es nuestro COMPROMISO.

COMPOSICIÓN

Cada tableta recubierta contiene:
Clopidogrel bisulfato 0.0979 g.
equivalente a 75mg. de Clopidogrel base
Excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

QUÉ ES COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS Y PARA QUÉ SE UTILIZA:

COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiagregantes, plaquetarios. Las plaquetas son unos elementos de la sangre más pequeños que los glóbulos rojos o blancos, y se agregan cuando la sangre se coagula. Los medicamentos antiagregantes plaquetarios al prevenir dicha agregación, reducen la posibilidad de que se produzcan coágulos sanguíneos (un proceso denominado trombosis).

COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS se administra para prevenir la formación de coágulos sanguíneos (trombos) en vasos sanguíneos (arterias) endurecidos, un proceso conocido como aterotrombosis, y que puede provocar efectos aterotrombóticos (como infarto cerebral, infarto de miocardio o muerte).

Se le ha prescrito COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS para ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y reducir el riesgo de estos acontecimientos graves ya que:

- Usted sufre un proceso que produce el endurecimiento de las arterias (también denominado aterotrombosis),
- Usted ha sufrido previamente un infarto de miocardio, un infarto cerebral o sufre una enfermedad denominada enfermedad arterial periférica, o
- Usted ha sufrido un tipo de dolor torácico grave, conocido como "angina inestable" o "infarto de miocardio". Para el tratamiento de esta enfermedad, su médico puede tener que colocar un stent (tubo diminuto) en la arteria obstruida o estrechada para restablecer el flujo sanguíneo adecuado. Es posible que su médico también le haya prescrito ácido acetilsalicílico (sustancia presente en muchos medicamentos utilizados para aliviar el dolor y bajar la fiebre, así como para prevenir la formación de coágulos sanguíneos).

ANTES DE TOMAR COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS:

No tome COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS:

- Si es alérgico (hipersensible) a clopidogrel o a cualquiera de los demás componentes de COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS;
- Si padece una hemorragia activa, como una úlcera de estómago o hemorragia en el cerebro;
- Si sufre una enfermedad grave del hígado.
- Si cree que algo de esto puede afectarle, o si tiene alguna duda, consulte a su médico antes de tomar COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS.

Tenga especial cuidado con COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS:

Antes de empezar el tratamiento informe a su médico si se encuentra en alguna de las situaciones descritas a continuación:

- Si tiene riesgo de sufrir una hemorragia (sangrado) porque:
- Padece una enfermedad que implica un riesgo de hemorragias internas (como una úlcera de estómago).
- Padece una anomalía sanguínea que le predispone a sufrir hemorragias internas (hemorragias en tejidos, órganos o articulaciones del organismo).
- Ha sufrido una herida grave recientemente.
- Se ha sometido recientemente a una intervención quirúrgica (incluyendo cirugía dental).
- Debe someterse a una intervención quirúrgica (incluyendo cirugía dental) en los próximos siete días.
- Si ha tenido un coágulo en una arteria del cerebro (infarto cerebral isquémico) en los últimos 7 días.
- Si está usted usando otro tipo de medicamentos (ver "Uso de otros medicamentos").
- Si padece enfermedades del hígado o del riñón.

DURANTE EL TRATAMIENTO CON COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS:

- Informe a su médico si tiene prevista una intervención quirúrgica (incluyendo cirugía dental).
- Informe a su médico inmediatamente si desarrolla un trastorno que incluya fiebre y hematomas (moratones) bajo la piel que pueden aparecer como puntos rojos localizados, acompañados o no de inexplicable cansancio extremo, confusión, color amarillo en la piel o los ojos (ictericia).
- Si se corta o se hace una herida, la hemorragia puede tardar más de lo normal en detenerse. Esto está relacionado con el modo en que actúa el medicamento, ya que este previene de la capacidad de la sangre para formar coágulos. Para cortes o heridas de poca importancia, como por ejemplo cortarse durante el afeitado, esto no tiene importancia. No obstante, si está preocupado por su pérdida de sangre, consulte inmediatamente con su médico.

- Su médico puede pedirle que se haga análisis de sangre.

- Informe a su médico o farmacéutico si observa cualquier efecto adverso no mencionado en "POSIBLES EFECTOS ADVERSOS" de este prospecto o si observa que algún efecto adverso empeora.

COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS no debe administrarse a niños ni adolescentes.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS:

Algunos medicamentos pueden influir en el uso de COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS o viceversa.

Informe a su médico o farmacéutico si está usando o ha usado recientemente, otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

No se recomienda la administración conjunta de COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS con anticoagulantes orales (medicamentos utilizados para disminuir la coagulación sanguínea).

Debe informar expresamente a su médico si está tomando antiinflamatorios no esteroideos, fármacos utilizados generalmente para tratar el dolor y/o la inflamación de músculos o articulaciones, o si está tomando heparina, o cualquier otro medicamento utilizado para disminuir la coagulación sanguínea, o si está tomando un inhibidor de la bomba de protones para sus molestias de estómago (como Omeprazol).

Si usted ha sufrido dolor torácico grave (angina inestable o infarto de miocardio), quizás le han prescrito COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS en combinación con ácido acetilsalicílico, sustancia presente en muchos medicamentos utilizados para aliviar el dolor y bajar la fiebre. Una dosis de ácido acetilsalicílico administrada esporádicamente (no superior a 1.000 mg en 24 horas) no debe causar ningún problema, pero el uso prolongado en otras circunstancias debe consultarse con su médico.

Toma de COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS con los alimentos y bebidas:

Los alimentos/comidas no tienen ninguna influencia y por tanto COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS puede tomarse con y sin alimentos.

Embarazo y lactancia

Es preferible no utilizar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Si está embarazada o cree que puede estarlo, debe avisar a su médico o farmacéutico antes de tomar COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS si se queda embarazada mientras está tomando COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS, consulte a su médico inmediatamente ya que no se recomienda tomar clopidogrel durante el embarazo.

Si está tomando COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS, consulte con su médico acerca de la lactancia materna. Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Es poco probable que COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS altere su capacidad de conducir o manejar maquinaria.

Información importante sobre algunos de los componentes COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS

COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS contiene lactosa.

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

CÓMO TOMAR COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS:

Siga exactamente las instrucciones de administración de COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Si ha sufrido dolor torácico grave (angina inestable o infarto), su médico puede prescribirle 300 mg de COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS (4 comprimidos de 75 mg) para que los tome una única vez al inicio del tratamiento. Después, la dosis normal es de un comprimido de 75 mg de COENXIO[®]L al día, administrado por vía oral, con o sin alimentos, y a la misma hora cada día.

Deberá tomar COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS durante el tiempo que su médico continúe prescribiéndoselo.

Si toma más COENXIO[®]L 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS del que debiera:

Contacte con su médico o acuda al servicio de urgencias del hospital más próximo, ya que existe un mayor riesgo de hemorragia. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Si olvidó tomar COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS:

Si olvida tomar una dosis de COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS, pero se acuerda antes de que hayan transcurrido 12 horas desde el momento en que debía haber tomado la medicación, tome el comprimido inmediatamente y el siguiente a la hora habitual.

Si se olvida durante más de 12 horas, simplemente tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS:

No interrumpa su tratamiento. Contacte con su médico o farmacéutico antes de dejar de tomar este medicamento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Los efectos adversos observados se describen a continuación según la frecuencia de presentación:

Muy frecuentes: afectan a más de 1 de cada 10 personas Frecuentes: afectan a entre 1 y 10 de cada 100 personas Poco frecuentes: afectan a entre 1 y 10 de cada 1000 personas Raros: afectan a entre 1 y 10 de cada 10.000 personas Muy raros: afectan a menos de 1 de cada 10.000 personas Desconocidos: la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles

Contacte con su médico inmediatamente si experimenta:

- fiebre, signos de infección o cansancio grave. Estos síntomas pueden deberse a un raro descenso de algunas células de la sangre.
- Signos de problemas del hígado, tales como coloración amarilla de la piel y/o los ojos (ictericia), asociada o no a hemorragia que aparece bajo la piel como puntos rojos y/o confusión
- Hinchazón de la boca o trastornos de la piel tales como sarpullidos y picores, ampollas en la piel. Estos pueden ser signos de una reacción alérgica.

El efecto adverso más frecuente notificado con COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS es la hemorragia.

La hemorragia puede aparecer en el estómago o intestino, magulladuras, hematomas (sangrado anormal o moratones bajo la piel), hemorragia nasal, sangre en orina. También se han notificado un reducido número de casos de hemorragia de los vasos sanguíneos de los ojos, hemorragia intracraneal, pulmonar o de articulaciones.

Si sufre una hemorragia prolongada mientras está tomando COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS.

Si se corta o se hace una herida es posible que la hemorragia tarde un poco más de lo normal en detenerse. Esto está relacionado con el mecanismo de acción del medicamento, ya que previene la capacidad de la sangre para formar coágulos. Para cortes o heridas de poca importancia, como por ejemplo cortarse durante el afeitado, esto normalmente no tiene importancia. Sin embargo, si está preocupado por su hemorragia, consulte con su médico inmediatamente.

Otros efectos adversos notificados con COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS son:

Efectos adversos frecuentes: diarrea, dolor abdominal, indigestión o ardor.

Efectos adversos poco frecuentes: dolor de cabeza, úlcera de estómago, vómitos, náuseas, estreñimiento, exceso de gases en el estómago o intestino, erupciones, escozor, mareo, alteración del tacto.

Efectos adversos raros: vértigo.

Efectos adversos muy raros: ictericia, dolor abdominal grave con o sin dolor de espalda; fiebre, dificultad para respirar, en ocasiones asociada a tos; reacciones alérgicas generalizadas; hinchazón de la boca; ampollas en la piel, alergia en la piel; inflamación de la mucosa de la boca (estomatitis); disminución de la presión arterial; confusión; alucinaciones; dolor articular; dolor muscular; alteración del gusto.

Además su médico puede observar cambios en los resultados de sus análisis de sangre u orina.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN DE COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice COENXIOL 75 mg TABLETAS RECUBIERTAS después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Caja x 14, 10, 20, Tabletas Recubiertas.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

ELABORADO POR:

INDEUREC S.A.
Km. 2 ½ Autopista Durán-Boliche
Durán – Ecuador

