

# ESPIDIFEN®

Arginato de Ibuprofeno 600 mg



## COMPOSICIÓN:

Cada sobre de 3 g contiene:  
Arginato de Ibuprofeno granulado  
(equivalentes a 600 mg Ibuprofeno, 555 mg L-Arginina);  
excipientes c.s.p.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

## CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

El Ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico. A partir de los 5 minutos el Arginato de Ibuprofeno presentó concentraciones superiores a 30 ug/ml que es más que suficiente para producir analgesia, lo que no ocurre en el estudio comparativo con Ibuprofeno sólo que alcanza esa concentración a los 30 minutos.

La Arginina es un aminoácido básico que en la mucosa intestinal posee un mecanismo de transporte biológico activo y específico que se encarga de tomar la Arginina de la luz intestinal y transportarla rápidamente hacia el torrente circulatorio. La característica de lo básico de la Arginina unido a las propiedades ácidas del Ibuprofeno hace que ambos se unan en un enlace iónico cuando se encuentran en solución, Éste complejo es reconocido por el transportador de Arginina y pasa el Ibuprofeno así unido al torrente circulatorio, es así como la Arginina acelera la absorción del Ibuprofeno a través de la pared intestinal logrando concentraciones más elevadas y en menor tiempo.

La Arginina aumenta la velocidad de absorción del Ibuprofeno.

Espidifen actúa periféricamente inhibiendo la síntesis de prostaglandinas mediante el bloqueo de las ciclooxigenasas, con propiedades analgésicas antipiréticas y antiinflamatorias.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de lesiones de tejidos blandos como torceduras y esguinces. Tratamiento de procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, tratamiento sintomático de la cefalea tensional y lumbalgia mecánica. Alivio de la sintomatología en la dismenorrea o cólico menstrual. Tratamiento sintomático de fiebre en cuadros febriles de etiología diversa. Procesos de artritis u osteoartritis.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda en adultos y mayores de 18 años.

La posología deberá ajustarse en función de la gravedad y molestia del paciente.

Se tomará un sobre cada 12 u 8 horas dependiendo de la intensidad del cuadro y de la respuesta al tratamiento, en algunos procesos puede requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2400 mg en adultos.

## CONTRAINDICACIONES:

ESPIDIFEN® no debe administrarse en los siguientes casos:

- Hipersensibilidad conocida a Ibuprofeno, a otros AINEs o cualquiera de los excipientes de la formulación.
- Pacientes que hayan experimentado crisis de asma, rinitis aguda, urticaria, edema angioneurótico u otras reacciones de tipo alérgico tras haber utilizado sustancias de acción similar (p. ej. Ácido acetilsalicílico u otros AINEs).
- Hemorragia.
- Úlcera péptica.
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
- Disfunción renal.
- Pacientes con diátesis hemorrágicas u otros trastornos de la coagulación.
- Embarazo Tercer trimestre de la gestación.
- Niños o en adolescentes menores a 18 años ya que la dosis de Ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología recomendada en estos niños.

## EMBARAZO Y LACTANCIA:

A pesar que no se han detectado efectos teratogénicos en los estudios de toxicidad realizados en animales tras la administración de Ibuprofeno, debe evitarse su uso durante el tercer trimestre del embarazo. Pueden inhibir el trabajo de parto y retrasar el parto. Pueden producir el cierre prematuro del ductus arteriosus.

A pesar de que las concentraciones de Ibuprofeno que se alcanzan en la leche materna son inapreciables y no son de esperar efectos indeseables en el lactante, no se recomienda el uso de Ibuprofeno durante la lactancia.

## DATOS FARMACÉUTICOS:

### INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN:

Se disuelve el contenido de un sobre en un vaso de agua al ambiente y se ingiere tras preparar la solución correspondiente.

### PRESENTACIÓN:

- ESPIDIFEN® 600 mg granulado sabor a durazno caja por 30 sobres.



# Zambon