

# INMUFLU®



## COMPOSICIÓN:

Cada 5 ml del jarabe contiene: Metisoprinol 250 mg  
Cada tableta recubierta contiene: Metisoprinol 500 mg  
Excipientes C.S.P.

## VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

## FARMACODINAMIA:

- Metisoprinol permite una pronta respuesta del sistema de inmunidad al tiempo que impide la replicación viral, produciéndose rápidamente la desaparición de síntomas clínicos.
- El incremento en la respuesta de la tercera barrera natural del organismo (sistema inmune) contra los antígenos infectantes se produce por:
  - Estimulación en la producción de células T o linfocitos T.
  - Aumento de la función de los linfocitos T asesinos.
  - Apoyo a la función de las células asesinas naturales (NK).
  - Incremento de la actividad de las células B (linfocitos B) y con ello la producción de inmunoglobulinas.
  - Intensificación de la actividad fagocitaria. De hecho, se produce un fortalecimiento de la respuesta inmune a nivel celular y humoral.

## PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

- Es rápidamente metabolizado, excretándose casi exclusivamente con la orina, en un 90% en forma de alantoina y ácido úrico.
- Su semivida de eliminación es de 0.85 horas

## INDICACIONES:

Padecimientos que cursan con distintos grados de inmunodeficiencia como:

- Herpes labial y genital, recurrentes.
- Herpes zoster.
- Enfermedades eruptivas de la infancia.
- Rinovirus e influenza.

## CONTRAINDICACIONES:

- Antecedentes de hipersensibilidad al Metisoprinol.

## REACCIONES ADVERSAS:

Debido al metabolismo del componente inosina del Metisoprinol a ácido úrico, se puede presentar elevación moderada del ácido úrico sérico y urinario, por tanto se debe administrar bajo vigilancia médica a pacientes con historia de hiperuricemia y gota.

## PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO:

No hay estudios adecuados y bien controlados en embarazadas. El uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. Administrar con precaución considerando riesgo-beneficio.

## PRECAUCIONES DURANTE LA LACTANCIA:

Se ignora si este medicamento es excretado con la leche materna. Uso no recomendado en madres lactantes. Administrar con precaución considerando riesgo beneficio.

## INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:

En casos de complicaciones bacterianas, en pacientes inmunodeprimidos no existe ninguna contraindicación para asociar Metisoprinol con antibióticos o sulfamidas, de acuerdo con el criterio del médico.

Comunique a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando. No existen evidencias de interacciones entre el Metisoprinol y otros medicamentos.

## DOSIFICACIÓN:

- Niños menores de 1 año: ½ cucharadita (2,5 ml) cada 4 horas.
- De 1 a 5 años: 1 cucharadita (5 ml) cada 4 horas.
- De 5 a 10 años: 1½ cucharadita (7,5 ml) cada 4 horas.
- Adultos: 10 ml cada 4 horas o 2 tabletas como primera toma, luego 1 tableta cada 4 horas.

La duración media del tratamiento es de 7 a 10 días.

## ADVERTENCIA:

Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.

## RECOMENDACIONES:

- Conservar a temperatura menor a 30° C, proteger de la humedad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Agitar antes de usar (Jarabe).

## VENTA BAJO RECETA MÉDICA

## PRESENTACIONES:

Frasco x 120 ml sabor a frutas piña.  
Caja x 20 tabletas recubiertas.

