

MICOFEN[®] PLUS (OVULOS)



COMPOSICIÓN:

Cada óvulo vaginal contiene:
Miconazol nitrato... 100 mg.
Tinidazol... 150 mg.
Excipientes: Masa para óvulos (lactosa, Carbowax 1450, Carbowax 3350);
Dióxido de silicio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vaginal.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:

El Tinidazol, es un derivado del nitroimidazol dotado de amplio espectro de actividad contra tricomonas y giardias.
La presentación en óvulos vaginales facilita su uso.

Miconazol nitrato, actúa en la membrana celular del agente micótico. Inhibe la síntesis de ergosterol, dañando la membrana celular del agente infeccioso por alteración de la permeabilidad.
En particular, en la *Cándida albicans* inhibe la transformación de blastosporas en la forma miceloide invasiva.

INDICACIONES:

Está indicado en el tratamiento local de infecciones urogenitales causadas por *Trichomonas vaginalis* y/o por *Cándida albicans*:

- Vulvovaginitis específicas (tricomoniasis, candidiasis).
- Vaginosis bacterianas (por *Gardnerella* o anaerobios).
- Vulvovaginitis mixtas.

ADVERTENCIAS:

No se han de consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
Interrumpir la lactancia durante el tratamiento.
No usar en pacientes que portan contraceptivos.
Debe discontinuarse el uso si durante el tratamiento se producen reacciones de sensibilización o irritación. No interrumpir el tratamiento durante el período de menstruación.
No se recomienda la aplicación de MICOFEN PLUS en pacientes que porten diafragmas contraceptivos uterinos, ya que puede interactuar con aquellos confeccionados con cierta clase de látex.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los componentes de la fórmula. Uso de diafragmas y preservativos de látex (riesgo de ruptura), así como productos espermaticidas (riesgo de inactivación), MICOFEN PLUS puede reducir la efectividad y seguridad de estos métodos.

EFFECTOS ADVERSOS:

Es muy bien tolerado en su aplicación vaginal. En muy pocas pacientes se pueden presentar reacciones caracterizadas por ligera sensación de ardor. Cesa espontáneamente y no debe ser causa de interrupción del tratamiento.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

Embarazo:
Durante los 3 primeros meses de embarazo, sólo debe administrarse si el médico lo cree esencial para el bienestar de la paciente.

Lactancia:
Interrumpir la lactancia durante el tratamiento.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Es poco probable que esto ocurra pero en todo caso el medicamento no es irritante y prácticamente no se absorbe por vía vaginal.

DOSIFICACIÓN Y POSOLOGIA:

Aplicar profundamente en la vagina 1 óvulo una vez al día, antes de acostarse, durante 10 días seguidos.

Vía de administración: Vaginal.

CONSERVACIÓN DE MICOFEN PLUS:

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No utilice después de la fecha de caducidad.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Presentaciones Comerciales
Caja x 1 ristra x 5 óvulos c/u + prospecto
Caja x 2 ristra x 5 óvulos c/u + prospecto
Caja x 1 ristra x 10 óvulos c/u + prospecto
Caja x 1 ristra x 2 óvulos c/u + prospecto
Caja x 1 ristra x 1 óvulo c/u + prospecto (Muestra Médica)

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

ELABORADO POR:

INDEUREC S.A.
Km 2 1/2 de la Vía Durán - Boliche,
Durán, Ecuador.



Biindustria[®]
"Protegemos su salud con calidad"