

Monurol 3g

Fosfomicina trometamol
Granulado



Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas, puede perjudicarlas, aun cuando sus síntomas sean los mismos suyos.

En este prospecto:

1. Qué es Monurol 3 g y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Monurol 3 g
3. Cómo tomar los sobres de Monurol 3 g
4. Posibles efectos Adversos
5. Conservación de Monurol 3 g

Cada sobre de granulado contiene:

Como principio activo: Fosfomicina (DCI)
Trometamol 5,631 g (Equivalente a 3 g de Fosfomicina)
Como excipientes: sacarina, sacarosa, aroma a naranja, aroma a mandarina

Elaborado por

ZAMBON SWITZERLAND LTD.

Vía Industria 13
6814 Cadempino (Suiza)

1. Qué es Monurol 3 g y para qué se utiliza

Monurol 3 g se presenta en forma de sobre que contiene gránulos para disolver en agua. Cada caja contiene 1 sobre.
Monurol 3 g pertenece al grupo de antibióticos para las vías urinarias.
Monurol 3 g está indicado en la prevención y tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas de las vías urinarias bajas, producidas por gérmenes sensibles a la Fosfomicina.

2. Antes de tomar Monurol 3 g

No tome Monurol 3 g:

- Si usted es alérgico a la Fosfomicina trometamol o a cualquiera de los componentes del producto.
- Si usted padece una enfermedad grave de los riñones
- No administrar en pacientes menores de 6 años

Tenga especial cuidado con Monurol 3 g

-Antes de la administración de fosfomicina se investigará en el paciente la posible existencia previa de manifestaciones alérgicas a la Fosfomicina.
Si tras el tratamiento con Monurol 3 g al cabo de 2 ó 3 días alguno (s) de los síntomas persisten, no es indicativo de falta de eficacia terapéutica, sino que puede deberse a la inflamación previa (ver como tomar Monurol 3 g)
- Si está usted embarazada o en período de lactancia (Ver "Embarazo y lactancia")

Toma de Monurol 3 g con alimentos y bebidas:

Se recomienda administrar el tratamiento con el estómago vacío, o bien 1 hora antes de ingerir alimentos, o bien 2 horas después de ingerirlos, ya que éstos pueden retrasar la absorción de la Fosfomicina trometamol.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico antes de tomar un medicamento.
Monurol 3 g se debe tomar con precaución durante el embarazo, y siempre bajo estricto control del médico.
Aunque sólo pasan pequeñas cantidades del medicamento a la leche materna, se recomienda no tomar Monurol 3 g por períodos prolongados durante la lactancia.

Información importante sobre algunos de los componentes de Monurol 3 g:

Este medicamento contiene 2,213 g de sacarosa por sobre, lo que debe ser tenido en cuenta por los pacientes diabéticos.

Toma de otros medicamentos:

Monurol 3 g no debe tomarse con metoclopramida, ya que puede interferir la actividad de la Fosfomicina y reducir su absorción.
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR Monurol 3 g

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento.
Su médico le indicará la duración del tratamiento con Monurol 3 g. No suspenda el tratamiento antes, ya que entonces no se obtendrían los resultados esperados. Si usted estima que la acción de Monurol 3 g es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico.

Adultos:

Monurol 3 g se toma disuelto en medio vaso de agua u otro líquido.
En las infecciones agudas de las vías urinarias bajas producidas por gérmenes sensibles a la Fosfomicina, la posología es 1 sobre de Monurol 3 g en una sola dosis.
En la profilaxis de infecciones urinarias seguidas de intervención quirúrgica y maniobras trans-uretrales diagnósticas, la posología es 1 sobre de Monurol 3 g 3 horas antes y otro sobre de Monurol 3 g 24 horas después de la intervención. Los síntomas clínicos desaparecen generalmente 2 ó 3 días después del tratamiento.
La eventual persistencia de algunos síntomas locales no es, necesariamente, un signo de fallo terapéutico, sino que puede ser debida a la inflamación previa.

Ancianos:

En pacientes ancianos, o en caso de infecciones debidas a gérmenes que son sensibles a dosis más elevadas de antibiótico, pueden ser necesarios 2 sobres de Monurol 3 g administrados con un intervalo de 24 horas.

Si usted toma más sobres de Monurol 3 g de los que debiera: Si usted ha tomado más sobres de Monurol 3 g de los que debe, consulte inmediatamente a su médico. Si se ha producido una intoxicación grave, el médico adoptará las medidas necesarias.

En caso de ingestión de cantidades importantes es suficiente favorecer la eliminación urinaria del principio activo mediante la administración de líquidos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Monurol 3 g:

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si olvidó tomar su dosis correspondiente, tómela tan pronto como se acuerde. Sin embargo, si la hora de la siguiente toma está muy próxima, salte la dosis que olvidó y tome la dosis siguiente en su hora habitual.

4. POSIBLES EVENTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Monurol 3 g puede tener efectos adversos. Los efectos adversos que se han presentado de forma ocasional son náuseas, pirosis (sensación de quemazón en el pecho) y diarrea. Raramente se han observado reacciones alérgicas graves incluida anafilaxis (reacción grave que puede comprometer la vida).

5. CONSERVACIÓN DE Monurol 3 g

Mantenga Monurol 3 g fuera del alcance y de la vista de los niños.
Conservar a temperatura no mayor a 30°C

Caducidad: No utilizar Monurol 3 g después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Importado y Distribuido por Farmayala Pharmaceutical Company
Reg Sanitario :1293-MEE-0815

