

# MOPINAL GOTAS®



CORPORACIÓN  
**FARMAYALA**

Su salud es nuestro COMPROMISO.

## COMPOSICIÓN:

Cada 1 mL de solución oral contiene:  
Propinox Clorhidrato 10 mg  
Excipientes c.s.p.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

## GRUPO FARMACÉUTICO:

Antiespasmódico

## MECANISMO DE ACCIÓN:

- El Propinox es un antagonista moderado y no selectivo de los receptores muscarínicos y con acción directa sobre el músculo liso visceral.

## PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

-Luego de la administración oral la concentración plasmática se alcanza a los 60 minutos. El Propinox presenta una vida media de eliminación plasmática de 4 horas y un volumen de distribución de 2 l/kg. La unión a las proteínas plasmáticas es de 91%.  
- La eliminación se hace mediante biotransformación hepática.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de todos los síndromes viscerales, agudos o crónicos y cuyo principal componente es el espasmo muscular con asiento en cualquier porción del tracto digestivo o de los aparatos hepatobiliar, urinario o genital femenino.

## CONTRAINDICACIONES:

- No usar para el tratamiento del cólico del lactante ni en cuadros de diarrea en niños.  
- Es conveniente evitar su empleo también en Glaucoma, retención urinaria por enfermedades prostáticas y estenosis pilórica orgánica.

## REACCIONES ADVERSAS:

En pacientes particularmente sensibles, al administrar dosis altas, puede aparecer sequedad de boca o constipación, modificables mediante un ajuste posológico.

Se suspenderá el tratamiento consultando al médico, si se presentaran reacciones alérgicas en la piel y/o mucosas.

## INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:

Administrar con precaución a pacientes que se encuentren recibiendo drogas anticolinérgicas u otros medicamentos que puedan presentar efectos anticolinérgicos (antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina, fenotiazinas, etc).

En estos casos puede producirse una sumatoria de efectos. Los antidiarreicos adsorbentes y los antiácidos pueden disminuir la absorción de los anticolinérgicos.

Los efectos inhibitorios sobre la secreción ácida gástrica, con el consiguiente aumento del pH gástrico, pueden producir disminución de la absorción del ketoconazol y el itraconazol.

## ADVERTENCIAS:

En dosis superiores a las habituales también puede inhibir la sudoración con el consiguiente aumento de la temperatura corporal, hecho que debe tenerse en cuenta en pacientes con fiebre o en ambientes con temperatura elevada. No usar para el tratamiento del cólico del lactante ni en cuadros de diarrea en niños.

## Embarazo:

Los estudios toxicológicos preclínicos no han evidenciado efectos teratogénicos. Sin embargo, como es de buena práctica en farmacología clínica sólo debería emplearse durante el embarazo si los beneficios potenciales resultan superiores a los eventuales riesgos. Se recomienda no administrarlo durante el primer trimestre del embarazo.

## Lactancia:

No se dispone de estudios que investiguen la posible aparición de Propinox en la leche materna. Mopinal no debe ser administrado durante la lactancia. Los anticolinérgicos pueden inhibir la lactancia.

## Uso geriátrico:

Los pacientes ancianos pueden presentar una mayor sensibilidad a los anticolinérgicos y una mayor incidencia de efectos adversos (retención urinaria, estreñimiento, sequedad bucal, etc). Se recomienda administrarlo con precaución por el riesgo de glaucoma no diagnosticado.

## Efecto sobre la capacidad de conducir y operar maquinarias:

La administración de dosis elevadas puede producir trastornos de la acomodación; por lo tanto, se recomienda administrarlo con precaución y evitar la conducción de vehículos y la operación de maquinarias peligrosas hasta lograr la normalización de la visión.

## DOSIFICACIÓN:

Adultos y niños mayores de 10 años: 20 gotas, hasta 5 veces por día.  
Niños de 1 a 10 años: 1-2 gotas por cada año de edad, hasta 5 veces por día.

## ACCIONES A TOMAR EN CASO DE SOBREDOSIFICACIÓN:

No se han informado casos de sobredosis no tratada con esta sustancia. Sin embargo, se supone que los síntomas de sobredosis corresponden a los de los anticolinérgicos (retención urinaria, sequedad bucal, rubor cutáneo, taquicardia, bloqueo de la motilidad gastrointestinal, trastornos de la visión).

Luego de una cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la administración, de la cantidad de drogas administradas y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional decidirá la realización o no del tratamiento de rescate.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano

## RECOMENDACIONES:

- Conservar a temperatura menor a 30° C, proteger de la humedad.  
- Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

## VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

## PRESENTACIÓN:

Caja x 1 frasco x 20 mL de solución



Elaborado por INDEUREC S.A. Durán - Ecuador.



Farmayala Medicines

www.farmayala.com