

OTONEO[®]

(Tabletas recubiertas)



PRINCIPIO ACTIVO:

Cada tableta recubierta contiene

Otilonio Bromuro 40 mg

Excipientes: Almidón de maíz; Lactosa monohidrato; Sodio almidón glicolato; Estearato de magnesio; Agua purificada; Opadry blanco; Carbowax 6000 (polietilenglicol 6000); Alcohol etílico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

Su ingestión es por vía oral. Su absorción sistémica es del 3 - 5 %

El fármaco se acumula en el músculo liso del intestino

Se elimina en el 95 - 97 % por vía fecal.

Posee una cadena alifática que permite un tratamiento a corto y a largo plazo.

PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS:

Actúa sobre dos niveles:

- En la motilidad intestinal: bloquea la entrada de los iones de calcio intra y extra celular. Bloquea los canales de calcio inducidos por la acetilcolina. Inhibe el acoplamiento de

los receptores muscarínicos (M) y de receptores de Takinina (Nk1 - Nk2) con ciertas

sustancias, evitando que estos se activen.

- En la sensibilidad: Antagonista del receptor de takinina (Nk2) en ciertos nervios eferentes viscerales, por lo que impide que se active por ciertas sustancias, produciendo un aumento en el umbral del dolor del paciente.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

- Síndrome del Intestino Irritable

- Estados espásticos y disquinesias del canal digestivo.

DOSIFICACIÓN:

- A partir de los 18 años y Adultos: Una tableta dos a tres veces al día, 20 minutos antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES:

- Obstrucción intestinal

- Hipersensibilidad al producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar si:

Está tomando varios medicamentos y/o es un paciente de edad avanzada tiene glaucoma (aumento de la presión en el ojo) tiene hipertrofia de próstata (agrandamiento de la próstata) tiene estenosis pilórica (dificultad en el paso del contenido del estómago al intestino) tiene problemas de hígado o de riñón tiene problemas de corazón como taquicardia (aumento del ritmo cardíaco) tiene hipertiroidismo (alteración de la glándula tiroidea) tiene colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria del intestino) tiene reflujo esofágico (paso del contenido del estómago al esófago).

Niños:

Antes de usar este medicamento consulte a su médico.

Ancianos:

Los pacientes de edad avanzada deben tomar este medicamento con precaución.

Interacciones medicamentosas:

Comunique su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia:

Si está embarazada o en periodo de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. La seguridad de uso de Otoneo durante el embarazo y la lactancia no ha sido aun establecida.

Conducción y uso de máquinas

Otoneo no interfiere sobre la capacidad de conducir vehículos o utilizar máquinas.

SOBREDOSIS

No se han descrito casos de sobredosis. En caso de sobredosis se pondrán en práctica las medidas estándar, lavado gástrico y tratamiento de soporte adecuado.

REACCIONES ADVERSAS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos,

aunque no todas las personas los sufran.

- dolor de cabeza

- náuseas, vómito, dolor en el estómago,

- urticaria

- vértigos

- fatiga

Comunicación de efectos adversos: Si experimenta cualquier tipo de reacción adversa consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos que no aparecen en este prospecto. Informe las reacciones adversas al sistema internacional de farmacovigilancia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C y en lugar seco. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Caja x 1 blíster x 10 Tabletas recubiertas + prospecto

Caja x 2 blíster x 10 Tabletas recubiertas + prospecto

Caja x 3 blíster x 10 tabletas recubiertas + prospecto

Caja x 2 blíster x 20 tabletas recubiertas + prospecto

RECOMENDACIONES:

Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA



Biindustria[®]
"Protegemos su salud con calidad"