

# RESPALIV<sup>®</sup>

## Tabletas Masticables

Cetrimonio Bromuro 2 mg + Lidocaína 1 mg  
Sabor a Menta



### COMPOSICIÓN:

Cada tableta masticable contiene:  
Cetrimonio Bromuro ..... 2 mg  
Lidocaína Clorhidrato ..... 1 mg  
Excipientes c.s.p.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

### PROPIEDADES:

- Cetrimonio es un antiséptico.
- El Cetrimonio es un agente catiónico con propiedades germicidas en baja concentración para una gran variedad de bacterias gram positivas y gram negativas, virus y hongos sensibles a este agente, razón por la cual se lo emplea como antiséptico de las mucosas.
- Lidocaína actúa como anestésico local.
- La Lidocaína impide la generación de la conducción del impulso nervioso por lo que disminuye el dolor y malestar causados por la inflamación e infección.

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

- Contiene un anestésico y un antiséptico que proporciona alivio local sintomático al disminuir el dolor y malestar producidos por las infecciones leves en boca y garganta.
- Antiséptico bucofaringeo.
- En caso de molestia, dolor en garganta o sensación de carraspera.

### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, y otros anestésicos locales tipo amida.

### REACCIONES ADVERSAS:

Rara vez el uso frecuente y prolongado puede causar irritación local. Consulte a su médico si observa cualquier otra reacción que cree puede ser provocada por Respaliv<sup>®</sup>.

### PRECAUCIONES GENERALES:

No utilizar cuando se presente una herida reciente en la cavidad bucofaringea. No administrar por más de 5 días, ya que puede modificar el equilibrio microbiano

natural de la garganta, ni superar la dosis máxima. Consulte a su médico si las molestias persisten más de 2 días, empeoran o se acompañan de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos.

No administrar en menores de 6 años.

### PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

Ningún efecto señalado. Si esta embarazada o en periodo de lactancia consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

### PRECAUCIONES PARA MANEJAR Y OPERAR MAQUINARIA:

La influencia de este medicamento sobre la capacidad para manejar y operar maquinaria es nula o insignificante.

### INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:

Se recomienda no tomar otros antisépticos bucofaringeos mientras se está consumiendo Respaliv<sup>®</sup>.

### DOSIFICACIÓN:

Adultos y niños mayores de 6 años de edad: 1 tableta cada 3 horas.

No consumir más de 8 comprimidos por día (4 comprimidos para los niños).

Dejar disolver lentamente en la boca. No exceder la dosis prescrita ni administrar por más de 5 días

### ADVERTENCIA:

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

### RECOMENDACIONES:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

### VENTA LIBRE

### PRESENTACIÓN:

Caja x 2 blister x 6 tabletas masticables c/u + prospecto



**Biindustria<sup>®</sup>**  
"Protegemos su salud con calidad"