

DIGESTIV[®] SUSPENSIÓN

(Magaldrato y Dimeticona)



COMPOSICIÓN:

Cada 10ml de suspensión contiene:

Magaldrato... 960mg.

Dimeticona... 250mg.

Excipientes c.s.p.: Celulosa microcristalina (Avicel CL611), Metilparabeno, Propilparabeno, Goma Xanthan, Sorbato de potasio, Sacarina sódica, Sorbitol USP 70%, Glicerina USP 99%, Sabor Vainilla Líquida, Sabor dulce de leche, Sabor leche condensada, Agua purificada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

INDICACIONES:

Digestiv Suspensión se utiliza para el tratamiento de la indigestión ácida, acidez estomacal, gas, y la acidez estomacal. También puede ser utilizado para otras condiciones según lo determine su médico.

Digestiv Suspensión es un antiácido y la combinación antiflatulento. El antiácido trabaja por neutralizar el ácido del estómago e incrementar el pH del estómago. El antiflatulento funciona mediante la ruptura de las burbujas de gas, lo que hace más fácil para eliminar los gases.

FARMACODINAMIA:

Si usted tiene alguna pregunta acerca de Digestiv Suspensión, por favor hable con su médico, farmacéutico.

Digestiv Suspensión debe ser utilizado sólo por el paciente para quien se prescribe. No la comparta con otras personas.

Si sus síntomas no mejoran o si empeoran, consulte con su médico.

Consulte a su farmacéutico acerca de cómo deshacerse de los medicamentos no utilizados. Esta información no debe ser usada para decidir si procede o no tener Digestiv Suspensión o cualquier otro medicamento. Sólo el médico tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para usted. Esta información no avala ningún medicamento es seguro, eficaz o aprobado para el tratamiento de cualquier paciente o estado de salud. Esto es sólo un breve resumen de la información general sobre Digestiv Suspensión. No incluye toda la información acerca de los usos posibles, instrucciones, advertencias, precauciones, interacciones, efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a Digestiv Suspensión. Usted debe hablar con su médico para obtener información completa sobre los riesgos y beneficios del uso Digestiv Suspensión.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios, consulte con su médico si cualquiera de estos efectos secundarios más comunes persisten o se vuelven molestos: Estreñimiento, diarrea, dolor intestinal. Reacciones alérgicas graves (erupción cutánea, urticaria, picazón, dificultad para respirar, opresión en el pecho, hinchazón de la boca, cara, labios, o lengua), heces negras y alquitranadas; pérdida del apetito, debilidad muscular, náuseas, reflejos lentos, vómitos; vómito con aspecto de café molido. Esto no es una lista completa de todos los efectos secundarios que pueden ocurrir. Si tiene alguna pregunta acerca de los efectos secundarios llame a su médico para consejo sobre efectos secundarios. Busque atención médica de inmediato si algunos de estos efectos secundarios graves se producen.

NO USE ESTE MEDICAMENTO SI USTED

Es alérgico a cualquier ingrediente de Digestiv Suspensión, si usted tiene un historial de problemas renales o si está tomando sales de citrato (que se encuentra en algunos suplementos de calcio, los antiácidos y laxantes) comuníquese con su médico de inmediato si alguno de estos se aplican a usted.

ANTES DE UTILIZAR DIGESTIV SUSPENSIÓN

Algunas condiciones médicas pueden interactuar con Digestiv Suspensión. Dígame a su médico o farmacéutico si tiene alguna condición médica, sobre todo si alguno de los siguientes casos:

Si usted está embarazada, planea quedar embarazada o si está en período de lactancia.
Si Ud. está tomando cualquier medicamento con prescripción o sin prescripción médica, preparado de hierbas o suplemento dietético, etc.

Si usted tiene apendicitis, el dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, obstrucción del intestino, sangrado rectal, de causa desconocida, problemas de riñón, o si ha tenido cirugía intestinal.
Si usted está en una dieta baja en magnesio.

Algunos medicamentos pueden interactuar con Digestiv Suspensión. Dígame a su médico si está tomando otros medicamentos, especialmente en cualquiera de los siguientes:

Los anticoagulantes (por ejemplo, warfarina), sales de citrato (que se encuentra en algunos suplementos de calcio, los antiácidos y laxantes), o quinidina porque sus acciones y efectos secundarios puede aumentar por Digestiv Suspensión.

Los bifosfonatos (por ejemplo, ácido alendrónico), resinas de intercambio catiónico (por ejemplo, sulfonato de poliestireno de sodio), cefalosporinas (por ejemplo, cefaclor), imidazoles (por ejemplo, flucanazol), micofenolato, penicilamina, quinolonas (por ejemplo, ciprofloxacina), tetraciclina (por ejemplo, doxiciclina) o las hormonas tiroideas debido a que su eficacia puede ser reducida por la suspensión Digestiv Suspensión.

Esto puede no ser una lista completa de todas las interacciones que pueden ocurrir. Pregunte a su médico si Digestiv Suspensión puede interactuar con otros medicamentos que usted toma. Consulte con su médico antes de iniciar, detener o cambiar la dosis de un medicamento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No exceda la dosis recomendada o el uso de la dosis máxima durante más de 2 semanas sin consultar con su médico.

Digestiv Suspensión contiene aluminio y magnesio (Magaldrato). Antes de comenzar a tomar cualquier prescripción o medicamentos de venta sin receta, lea los ingredientes para ver si también contiene aluminio o magnesio. Si no lo hace o si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico.

Las diferentes marcas de Digestiv Suspensión pueden tener diferentes instrucciones de dosificación para los niños en la etiqueta del envase. Siga las instrucciones de dosificación que aparecen en la etiqueta del medicamento o por su médico. Si no está seguro de la dosis para dar a un niño, consulte con su médico o farmacéutico.

Embarazo y lactancia: No se sabe si Digestiv Suspensión puede causar daño al feto. Si queda embarazada mientras toma Digestiv Suspensión, hable con su médico los beneficios y riesgos del uso de Digestiv Suspensión durante el embarazo. Digestiv Suspensión se excreta en la leche materna. Si usted está en período de lactancia mientras está utilizando Digestiv Suspensión, consulte con su médico.

COMO UTILIZAR DIGESTIV SUSPENSIÓN

Utilice Digestiv Suspensión como lo indique su médico. Revise la etiqueta del medicamento para la dosificación exacta.

Digestiv Suspensión se puede tomar con o sin alimentos.

Agite bien antes de usar.

Si olvida una dosis de Digestiv Suspensión y está tomando con regularidad, tómela tan pronto como sea posible. Si unas horas han pasado o si es casi la hora para la siguiente dosis, no duplique la dosis para ponerse al día, menos que lo indique su médico. No tome 2 dosis al mismo tiempo. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

CONSERVACIÓN DE DIGESTIV SUSPENSIÓN

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Caja x 1 frasco x 300ml; 200ml; 150ml de suspensión
Caja x 2; 4; 6; 10; 20; 30 sobres x 10ml de suspensión
Caja x 1 frasco x 50ml; 45ml de suspensión (muestra médica)
Caja x 3 sobres x 10ml de suspensión (muestra médica)

VENTA LIBRE

ELABORADO POR:

INDEUREC S.A.
Km 2 1/2 de la Vía Durán - Boliche,
Durán, Ecuador.

DISTRIBUIDO POR:

LABORATORIOS BIOINDUSTRIA LABIOSA S.A.
Durán – Ecuador



Biindustria[®]
"Protegemos su salud con calidad"