

DIGERIL FORTE®



COMPOSICIÓN:

Cada 10 mL de suspensión contiene:

- Magaldrato: 960 mg
- Simeticona: 250 mg
- Excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- Oral.

GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO:

Antiácido

FARMACOCINÉTICA:

- Las moléculas de Magaldrato y Simeticona no se absorben, por lo que carecen de efectos sistémicos. La cantidad de aluminio y magnesio que la molécula de Magaldrato libera es mínima.

MECANISMO DE ACCIÓN:

- El Magaldrato eleva el pH existente en la cavidad gástrica, neutralizando el ácido y como consecuencia disminuyendo los efectos agresivos de la pepsina cuya acción es dependiente del pH.
- La Simeticona actúa dispersando y previniendo la formación de burbujas de gases rodeadas de mucosidades reduciendo la tensión superficial de las burbujas.

INDICACIONES:

Con mayor concentración para aliviar:

- Acidez estomacal
- Gases
- Distensión abdominal
- Gastritis
- Reflujo gastroesofágico
- Dispepsia en el Embarazo

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a las sustancias.
- Insuficiencia renal grave.

EFFECTOS ADVERSOS:

- A dosis elevadas, puede producir defecaciones pastosas, elevada frecuencia de deposiciones y en raras ocasiones, diarrea. Sin embargo, a la dosis recomendada son muy raras tales manifestaciones.

DOSIFICACIÓN:

- A partir de los 12 años y Adultos: 10 mL o una cucharada cada 8 o 12 horas según la intensidad de los síntomas.

ADVERTENCIA:

Precaución en niños menores de 12 años.

Mantener fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES:

Conservar a temperatura menor a 30 °C
Agite antes de usar

PRESENTACIÓN:

- Suspensión frasco de 200 mL Sabor a VAINILLA.
- Suspensión frasco de 300 mL Sabor a VAINILLA.
- Caja x 30 sachets (pocket) x 10 mL de suspensión Sabor a VAINILLA.

VENTA LIBRE



Farmayala Medicines